



VIH/SIDA

Y LOS

HISPANOS



Para mayor información sobre el VIH/SIDA y los hispanos, sírvase contactar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades llamando al 1-800-458-5231; o visitando en Internet: www.cdcnpin.org

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) calculan que hoy en día, hay 850,000–950,000 personas VIH-positivas viviendo en los Estados Unidos, siendo esta la cifra más elevada desde el comienzo de la epidemia. Aproximadamente 180,000–280,000 individuos VIH-positivos no saben que están infectados y, por consiguiente, no se benefician de la atención y de los tratamientos existentes para el VIH. Sin saberlo, estos individuos pueden contagiar a otros con el virus. Además, hay 250,000 personas que a pesar de saber que son VIH-positivas, no están recibiendo la atención necesaria, ni el apoyo preventivo que les permita proteger a sus parejas. En total, aproximadamente la mitad de todas la personas que viven con el VIH en los Estados Unidos, no se han hecho la prueba, no reciben tratamiento y, en ciertos casos, nada de lo anterior.¹

- Hasta diciembre del año 2001 se reportaron a los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 833,452 casos de SIDA. Representando los hispanos:
 - El **19.8 por ciento** del **total** de casos de SIDA
 - El **20 por ciento** del total de casos de SIDA en **mujeres**
 - El **23 por ciento** del total de casos de SIDA en **niños**²
- Aproximadamente un **77 por ciento** de los adultos y adolescentes hispanos reportados con SIDA en los Estados Unidos hasta June del 2000, fueron hombres.²
- Entre enero y diciembre del 2001, el **19 por ciento** de los casos de SIDA reportados en adultos y adolescentes fueron entre los hispanos.²
- En 1998, los hombres de color representaron el **52 por ciento** de los casos de SIDA en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En 1989, los hombres de color representaron el **31 por ciento** de los casos de SIDA entre los integrantes de este mismo grupo.³
- En 2000, el VIH/SIDA fue la **segunda** causa principal de muerte entre los hombres hispanos de **35 a 44 años** de edad. Para ese mismo grupo de edad, en 2000 el HIV-SIDA fue la **cuarta** causa principal de muerte en las mujeres hispanas.⁴



El término “Hispano” incluye a aquellos individuos que se identifican a si mismos como “Latino/a” o “Hispano/a.”

¹ Fleming, PL., et al., “HIV Prevalence in the United States, 2000,” 9th Annual Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Feb. 24–28, 2002, Seattle, WA, Abstract 11.
² Centers for Disease Control and Prevention, *HIV/AIDS Surveillance Report 2001*, Vol. 13, No. 2.
³ Centers for Disease Control and Prevention, “HIV/AIDS Among Racial Ethnic Minority Men Who Have Sex With Men — United States, 1989–1998,” *Morbidity and Mortality Weekly Report*, Vol. 49, No. 01 (Jan. 14, 2000), pp. 4–11.
⁴ National Center for Health Statistics, *National Vital Statistics Reports* (Sept. 2002).