



VIH/SIDA

EN LOS

ESTADOS UNIDOS

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) calculan que hoy en día, hay 850,000–950,000 personas VIH-positivas viviendo en los Estados Unidos, siendo esta la cifra más elevada desde el comienzo de la epidemia. Aproximadamente 180,000–280,000 individuos VIH-positivos no saben que están infectados y, por consiguiente, no se benefician de la atención y de los tratamientos existentes para el VIH. Sin saberlo, estos individuos pueden contagiar a otros con el virus. Además, hay 250,000 personas que a pesar de saber que son VIH-positivas, no están recibiendo la atención necesaria, ni el apoyo preventivo que les permita proteger a sus parejas. En total, aproximadamente la mitad de todas las personas que viven con el VIH en los Estados Unidos, no se han hecho la prueba, no reciben tratamiento y, en ciertos casos, nada de lo anterior.¹

- Hasta diciembre del año 2001 se reportaron a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 833,452 casos de SIDA. De estos casos:
El 82 por ciento se dio en **hombres**
El 17 por ciento se dio en **mujeres**
El 1 por ciento se dio en **niños menores de 13 años** de edad²
- **El cuarenta y dos por ciento** de los casos acumulativos de SIDA se dio entre gente blanca, el **38 por ciento** entre negros, el **18 por ciento** entre hispanos, y menos del **1 por ciento**, en cada uno de los siguientes grupos: Asiáticos Estadounidenses u originarios de las Islas del Pacífico e Indígenas Estadounidenses o Nativos de Alaska.²
- Aproximadamente un **81 por ciento** de los adultos y adolescentes hispanos reportados con SIDA en los Estados Unidos hasta diciembre del año 2001, fueron hombres.²
- En el año 2000, los hombres de color representaron el **47 por ciento** de los casos de SIDA en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En comparación, en 1989 los hombres de color representaban solamente el **31 por ciento** de los casos de SIDA en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.³
- Los 10 Estados o Territorios que reportaron cumulativamente las cifras más elevadas de casos de SIDA entre sus residentes, son los siguientes: Nueva York, California, Florida, Tejas, Nueva Jersey, Illinois, Pensilvania, Puerto Rico, Georgia, y Maryland.²
- Hasta diciembre del año 2001, en áreas con reporte confidencial de VIH, se reportaron 174,026 personas viviendo con VIH diagnosticado (no SIDA). En el año 2001, se reportaron 35,575 casos de VIH provenientes de estas áreas.²
- Las mujeres representaron el **32 por ciento** de los casos de VIH (no SIDA) reportados en el año 2001, de las áreas con reporte confidencial de VIH. Entre ellas, las mujeres de raza negra y las hispanas representaron el **78 por ciento** de los casos. Entre los hombres con VIH (no SIDA) durante el mismo periodo de tiempo, los hombres de raza negra y los hispanos representaron el **63 por ciento** de los casos de VIH.²
- En las áreas con reporte confidencial de VIH, las personas de **13 a 24 años** de edad, representaron el **13 por ciento** de los casos nuevos de VIH (no SIDA) reportados en el año 2000. Entre estas personas, las mujeres representaron el **47 por ciento** de los casos en este grupo de edad.²
- Las mujeres en todos los grupos raciales/étnicos citan el **contacto heterosexual** o el **consumo de drogas inyectadas** como sus modos principales de exposición al VIH, mientras que las Asiáticas Estadounidenses o las originarias de las Islas del Pacífico, citan con mayor frecuencia el contacto heterosexual.²
- Más de un **50 por ciento** de los 40,000 casos nuevos de contagio por VIH, calculados anualmente, ocurren entre afroamericanos.

Para más información sobre el VIH/SIDA en los Estados Unidos, sírvase contactar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades llamando al **1-800-458-5231**; o visitando en Internet: www.cdcnpin.org.



Los términos “Afroamericano” y “Negro” se usan de manera intercambiable para incluir a aquellos individuos que se identifican a sí mismos como tales. El término “Hispano” incluye a aquellos individuos que se identifican a sí mismos como “Latino/a” o “Hispano/a”

¹ Fleming, P.L., et al., “HIV Prevalence in the United States, 2000,” 9th Annual Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Feb. 24–28, 2002, Seattle, WA, Abstract 11.

² Centers for Disease Control and Prevention, *HIV/AIDS Surveillance Report 2001*, Vol. 13, No. 2.

³ Centers for Disease Control and Prevention, “HIV/AIDS Among Racial Ethnic Minority Men Who Have Sex With Men — United States, 1989–1998,” *Morbidity and Mortality Weekly Report*, Vol. 49, No. 01 (Jan. 14, 2000), pp. 4–11.